

KULLANMA TALİMATI

BRICANYL® 2,5 mg Tablet

Ağız yoluyla kullanılır.

- **Etkin maddeler:** Her tablette 2,5 mg terbütalin sülfat bulunur.
- **Yardımcı maddeler:** Terbütalin sülfat, laktoz hidrus (sığır sütünden elde edilmiştir.), mısır nişastası, povidon k-30, mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat, etil alkol ve saf su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **BRICANYL® Tablet nedir ve ne için kullanılır?**
2. **BRICANYL® Tablet kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **BRICANYL® Tablet nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **BRICANYL® Tablet'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. BRICANYL® Tablet nedir ve ne için kullanılır?

BRICANYL® Tablet, solunum yolunu genişleterek nefes almayı kolaylaştırır.

BRICANYL® Tablet astımlı hastalarda veya diğer benzer durumlarda nefes daralması gibi belirtileri rahatlatmak için kullanılır. BRICANYL® Tablet beklenen solunum problemlerini önlemek için düzenli tedavi olarak kullanılır. **Ancak, BRICANYL® Tablet, başlamış olan akut bir astım atağını iyileştirmez.**

2. BRICANYL® Tablet kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BRICANYL® Tablet'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Terbütalin'e veya BRICANYL® Tablet içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız olması durumunda kullanılmamalıdır.

Önceden kalp damar hastalığı olan veya kalp damar rahatsızlığı açısından belirgin risk altında olan hastalarda erken doğum riskini önleyen ilaç (tokolitik) olarak kullanılmamalıdır.

BRICANYL® Tablet'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- BRICANYL® (terbütalin) veya bařka herhangi bir ilaca karřı beklenmeyen bir reaksiyonla karřılařtınsanız doktorunuza söyleyiniz.
- Hamileyseniz veya hamileliđiniz ile ilgili problemleriniz varsa,
- Bazı durumlarda BRICANYL® Tablet'in kullanımı özel dikkat gerektirir. Bu nedenle, bařka sađlık sorunlarınız, özellikle kalp rahatsızlıđı, dzensiz kalp ritmi, angina, řeker hastalıđı (diyabet) veya tiroid fonksiyon bozukluđunuz (hipertiroidizm) varsa, bunlar hakkında doktorunuzu her zaman bilgilendiriniz.
- řeker hastalıđınız varsa, BRICANYL® Tablet'e bařlamadan önce bazı ilave kan řeker testleri yaptırmanız gerekebilir.
- Doktorunuza kullanmakta olduđunuz tüm ilaçlar hakkında, reçetesiz olarak aldıklarınız da dahil, her zaman bilgi vermelisiniz. Ayrıca bakınız 'Diđer ilaçlar ile birlikte kullanımı'
- Tiroid beziniz aşırı çalışıyorsa
- BRICANYL® Tablet size sadece mevcut durumunuz için reçete edilmiştir. Doktorunuz tavsiye etmedikçe, bařka problemleriniz için kullanmayınız. İlacı hiçbir zaman bařka birine vermeyiniz.
- Kalp kası kalınlařmasına bađlı kalp büyümesi olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

BRICANYL® Tablet ile tedaviye bařlamadan önce, doktorunuzu hamile olduđunuz veya hamile kalmayı planladıđınız konusunda bilgilendiriniz. Hamileyseniz, ilaç kullanımı konusunda her zaman çok dikkatli olmalısınız. BRICANYL® Tablet, hamile kadınlar tarafından kullanıldıđında herhangi bir zararlı etki göstermemiřtir. Yine de BRICANYL® Tablet kullandıđınız dönemde hamile kalırsanız, mümkün olduđunca çabuk doktorunuzla temasa geçiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

BRICANYL® Tablet ile tedaviye bařlamadan önce, doktorunuza emzirmekte olduđunuzu söyleyiniz. Emzirme durumunda, ilaç kullanımı konusunda her zaman çok dikkatli olmalısınız. BRICANYL® Tablet, emzirmekte olan kadınlar tarafından kullanıldıđında herhangi bir zararlı etki göstermemiřtir.

Araç ve makine kullanımı

BRICANYL® Tablet araç ve makine kullanımını etkilemez.

BRICANYL® Tablet'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BRICANYL® Tablet, bir tür şeker olan laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere (bazı şekerlere karşı intolerans) karşı dayanamayacağınız veya sindiremeyeceğiniz söylendi ise, bu ilacı almadan önce doktorunuza bildiriniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Steroid ilaçlar (prednizolon gibi), ksantin ilaçlar (teofilin veya aminofilin gibi), beta blokör olarak isimlendirilen ilaçlar (yüksek tansiyon, kalp için kullanılan bazı ilaçlar, atenolol veya propranolol gibi ve bazı göz damlaları, timolol gibi) BRICANYL® ile eş zamanlı olarak kullanıldığında, BRICANYL®'in etkisini azaltabilir veya bloke edebilirler. BRICANYL® ile eş zamanlı kullanılan bazı belli ilaçların kan seviyesindeki tuz dengesine de etkileri olabilir (düşük potasyum seviyeleri). Genellikle bu önemsizdir, ancak bazı durumlarda kalp ritmi üzerinde etkisi olabilir. BRICANYL, adrenerjik ilaç (sempatik sinir sisteminin yaptığına benzer etkiler meydana getiren ilaçlar) kullanan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. BRICANYL'in çeşitli formları art arda uygulanmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BRICANYL® Tablet nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doz kişiye özeldir. Doktorunuzun talimatlarına dikkatlice uyunuz. Bunlar, bu talimatta bulunan bilgilerden farklı olabilir.

Her zamanki BRICANYL® Tablet dozunuz aynı rahatlatmayı sağlamıyorsa mümkün olduğunca çabuk bir şekilde doktorunuza başvurunuz. Astımınızı kontrol altına almak için ek tıbbi tedaviye ihtiyacınız olabilir. **BRICANYL® dozunu, doktorunuza danışmadan arttırmayınız.**

Yetişkinler için alışılmış doz:

Alışılmış başlangıç dozu günde 3 kez 1 tablet (2,5 mg)'dır. 1-2 haftalık tedavi sonrası doktorunuz dozu günde 3 kez 2 tablete (5 mg) çıkarabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı(7-15 yaş):

Alışılmış başlangıç dozu günde iki kez 1 tablet (2,5 mg)'dır. Eğer gerekirse doktorunuz dozu günde 3 tablete çıkarabilir.

Vücut ağırlığı: <20kg: Günde 3 defa ¼ - ½ tablet.

Vücut ağırlığı:20-30 kg: Günde 3 defa ½-1 tablet.

Vücut ağırlığı: >30 kg: Günde 3 defa 1-2 tablet.

Yaşlılarda kullanımı:

Yetişkinlerle aynı doz kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Veri yoktur.

Aşağıdaki durumlarda lütfen doktorunuz ile temasa geçiniz:

- Nefes almanız zorlaşıyorsa,
- Astım yüzünden geceleri sık sık uyanıyorsanız,
- Göğüs sıkışması yaşamaya başladığınız,
- Aldığınız mevcut doz ile rahatlama hissedemiyorsanız.

Bu uyarılar, astım rahatsızlığınızın kontrol altına alınmadığı ve hemen başka veya ilave bir tedaviye ihtiyacınız olduğu anlamına gelebilir.

Eğer BRICANYL® Tablet'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BRICANYL® Tablet kullandıysanız

BRICANYL® Tablet'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktorunuzun size reçete ettiğinden daha fazla tablet kullanmayınız. Daha fazlasını kullanmak, yan etki riskini arttıracaktır. Doz aşımı sonrasında en sık görülen belirti ve işaretler aşağıdaki gibidir:

- * mide bulantısı
- * baş ağrısı
- * hızlı veya düzensiz kalp atışı
- * kas krampları
- * sinirlilik, huzursuzluk, titreme
- * sersemlik veya sıra dışı uyusukluk

Bu belirtilerden herhangi biri sizi rahatsız ederse doktorunuza başvurunuz.

Eğer BRICANYL® Tablet dozunu almayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir doz almayı unutmuşsanız, dozu almayı unuttuğunuzu hatırlar hatırlamaz alınız. Ancak eğer bu, bir sonraki doz zamanına çok yakınsa, bir sonraki doza kadar bekleyiniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BRICANYL® Tablet'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler görülebilir, ancak genellikle bir veya iki haftalık tedavi sonrası kendiliğinden geçer. Ancak, aşağıdaki yan etkilerden biri sizi rahatsız ederse veya geçmezse doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın (10 kişide 1'den fazla kişiyi etkileyebilen)

- titreme

- baş ağrısı

Yaygın (10 kişide 1’den az kişiyi etkileyebilen)

- kalbinizin hızlı atması
- kas krampları
- kandaki potasyum seviyelerinde azalma

Yaygınlığı bilinmiyor*

- düzensiz kalp atışları
- mide bulantısı (hasta hissetme)
- endişeli hissetme, huzursuzluk veya uyku bozuklukları
- ciltte kızarıklık ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar
- Vücudun uç kısımlarında damar genişlemesi (periferal vazodilasyon)
- Alerjiye bağlı yüzde, gözde, dilde şişme gibi etkiler (anjiyoödem), havayolları daralması (bronkospazm), düşük tansiyon ve aşırı duyarlık reaksiyonları
- Ağız ve boğazda gıcıklanma
- İlacı alır almaz olan hava yolu daralması (paradoksikal bronkospazm)
- Uyku bozuklukları ve endişeli hissetme, huzursuzluk ve hiperaktivite gibi davranış değişiklikleri.

*Bu yan etkiler pazarlama sonrası raporlardan elde edilmiştir ve bu sebeple yaygınlığı bilinmemektedir.

Her ne kadar yaygınlığı bilinmese de bazı kişilerde zaman zaman göğüs ağrısı görülmüştür (angina gibi kalp problemlerine bağlı olarak). BRICANYL® Tablet kullandığınız süre içinde bu belirtiler oluşursa doktorunuza söyleyiniz, ancak doktorunuz aksini söylemedikçe ilacı kullanmayı bırakmayınız.

BRICANYL® Tablet kullanırken herhangi bir beklenmeyen etki fark ederseniz doktorunuza danışınız.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatı’nda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. BRICANYL® Tablet’in saklanması

BRICANYL® Tablet'i çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. BRICANYL® Tablet'i etiketinde ve dış ambalajında belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

AstraZeneca PLC, İngiltere lisansı ile
AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Büyükdere Cad.Yapı Kredi Plaza,
B Blok, Kat: 3-4 Levent/ İstanbul

Üretim Yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Büyükkarıştıran Mevkii 39780 Lüleburgaz

Bu kullanma talimatı 11.11.2015 tarihinde onaylanmıştır.