

KULLANMA TALİMATI

KOMBOGLYZE 2.5 mg/500 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 2.5 mg saksagliptin (saksagliptin hidroklorür olarak) ve 500 mg metformin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler: Povidon, magnezyum stearat, polivinil alkol, polietilen glikol 3350, titanyum dioksit (E171), talk (E553b), kırmızı demir oksit (E172), sarı demir oksit (E172), şellak, indigo karmin aluminyum lak (E132).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **KOMBOGLYZE nedir ve ne için kullanılır?**
2. **KOMBOGLYZE’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **KOMBOGLYZE nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **KOMBOGLYZE’nin saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. KOMBOGLYZE nedir ve ne için kullanılır?

- KOMBOGLYZE pembe renkte, her iki yüzü dışbükey, yuvarlak film kaplı tablettir. Mavi mürekkep ile bir tarafında “4245” ve diğer tarafında “2.5/500” baskısı vardır. KOMBOGLYZE 56 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
- KOMBOGLYZE tablet iki farklı etkin madde içerir:
 - DPP-4 inhibitörleri (dipeptidil peptidaz-4 inhibitörleri) olarak adlandırılan ilaç sınıfına ait olan saksagliptin ve,
 - Biguanidler olarak adlandırılan ilaç sınıfına ait olan metformin.

Her bir film kaplı tabletin içinde 2.5 mg saksagliptin (saksagliptin hidroklorür olarak) ve 500 mg metformin hidroklorür etkin maddeleri bulunmaktadır.

KOMBOGLYZE oral antidiyabetikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

- KOMBOGLYZE “tip 2 diyabet” olarak adlandırılan bir tür şeker hastalığının tedavisinde kullanılır.

- Saksagliptin ve metformin kanınızdaki şeker miktarını kontrol altında tutmak için birlikte kullanılırlar. Yemeklerden sonra insülin düzeyini artırır, vücudunuzun ürettiği şeker miktarını da azaltırlar. Diyet ve egzersizle birlikte kan şekerinizi düşürmenize yardımcı olurlar. KOMBOGLYZE tek başına veya kanınızdaki şeker miktarını düşüren insülin ile birlikte kullanılabilir.

Şeker hastalığınızı kontrol etmek için, bu ilacı alıyor olsanız dahi diyet ve egzersize devam etmeniz gerekir. Bu nedenle, size doktorunuz veya hemşireniz tarafından verilmiş olan diyet ve egzersiz önerilerine uymaya devam etmeniz önemlidir.

2. KOMBOGLYZE’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KOMBOGLYZE’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

- Saksagliptine, metformine veya bu ilacın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
- Kan şekerinizi kontrol etmek için kullandığınız benzer diğer ilaçlara karşı önceden ciddi alerjik (aşırı duyarlılık) reaksiyon gösterdiyseniz, Ciddi alerjik reaksiyonun belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
 - Deri döküntüsü
 - Cildinizde yama halinde kabarık kızarıklıklar (kurdeşen)
 - Nefes alma veya yutkunmada zorlanmaya sebep olabilecek yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişmeSizde bu belirtiler varsa, KOMBOGLYZE kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuzu veya hemşirenizi arayınız.
- Diyabetik koma (kan şekerinin aşırı yükselmesi) rahatsızlığı yaşadysanız,
- Diyabetik ketoasidoz adı verilen bir durum sizde varsa (bu, şeker hastalığı ile ortaya çıkan bir problem olup belirtileri hızlı kilo kaybı, kendini hasta hissetme veya hasta olma halidir).
- Böbrek veya karaciğer problemlerinizi varsa (serum kreatinin düzeyi erkeklerde >1.5 mg/dL ve kadınlarda >1.4 mg/dL, ya da anormal kreatin klirensinde),
- Yakın bir geçmişte kalp krizi geçirmişseniz veya kalp yetmezliğiniz ve kan dolaşımınızla ilgili ciddi problemlerinizi veya kalp problemlerinin belirtisi olabilen solunum güçlüğüünüz varsa,
- Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa veya vücudunuzda çok fazla su kaybı olmuşsa (dehidratasyon),
- Akciğer ya da bronş sisteminizi veya böbreklerinizi etkileyen ciddi bir enfeksiyon riskiniz varsa, ciddi enfeksiyonlar böbrek sorunlarına yol açabilir ve bu durum sizde laktik asidoz riski doğurabilir. Kalp yetmezliğinden tedavi görüyorsanız veya yakın bir geçmişte kalp krizi geçirmişseniz, kan dolaşımı ile ilgili ciddi problemlerinizi (şok gibi) varsa veya nefes almada güçlük çekiyorsanız, kan veya dokularda mikroorganizma yada patojenlerin bulunma riski ile oluşan sistemik bir hastalığınızı (septisemi) varsa, Bu durum dokular için oksijen kaynağının eksikliğine yol açabilir, bu da sizde laktik asidoz oluşma riski oluşturabilir.
- Emziriyorsanız (ayrıca bkz. “Hamilelik” ve “Emzirme”),
- Çok miktarda alkol tüketiyorsanız (her gün veya zaman zaman) (bkz. bölüm “KOMBOGLYZE’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması”),
- Enjekte edilebilen bir boyanın kullanıldığı X-ray cihazı ile ilgili herhangi bir işleme girecekseniz (doktorunuzu bu durumdan haberdar etmeniz ve X-ray cihazı ile görüntüleme

işlemi yapılacağı zaman ve böbreklerinizin nasıl çalıştığına bağlı olarak işlem sonrasındaki 2 gün boyunca veya daha uzun süre KOMBOGLYZE kullanmayı bırakmanız gerekir).

- Metabolik asidozdan şüphelenilirse,
- 18 yaşın altında iseniz.

KOMBOGLYZE’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Lütfen özel bir risk olarak laktik asidoza dikkat ediniz.

KOMBOGLYZE, özellikle de böbreklerinizin düzenli çalışmıyorsa, laktik asidoz denilen çok seyrek görülen fakat ciddi bir komplikasyona neden olabilir. Laktik asidoz riski, kontrol altında tutulmayan şeker hastalığı, uzun süreli açlık ya da alkol alımıyla da artmaktadır.

Laktik asidozun belirtileri kusma, kas kramplarıyla seyreden karın ağrısı, aşırı yorgunluk halinin eşlik ettiği genel olarak kendini iyi hissetmeme durumu ve nefes almada güçlüktür.

Eğer bu rahatsızlık sizde oluşuyorsa, acilen hastanede tedavi olmanız gerekebilir, çünkü laktik asidoz komaya ilerleyebilir. KOMBOGLYZE kullanmayı hemen bırakınız ve derhal bir doktor veya en yakın hastane ile temas kurunuz.

Eğer:

- Tip 1 diyabetiniz varsa (vücudunuz insülin üretmiyorsa), KOMBOGLYZE bu hastalığı tedavi etmek için kullanılmamalıdır.
- İnsülin veya “Sülfonilüre” olarak bilinen bir şeker hastalığı (diyabet) ilacı kullanıyorsanız, bu ilaçlardan birini KOMBOGLYZE ile birlikte kullandığımızda, kan şekerinizin düşmesini engellemek için, doktorunuz insülin veya sülfonilüre dozunuzu azaltmak isteyebilir.
- Kanınızdaki şeker miktarını kontrol etmek amacıyla aldığınız herhangi bir başka ilaca karşı daha önce alerjik reaksiyon geliştirdiyse,
- Enfeksiyonlara karşı vücudunuzun direncinizi azaltabilecek bir probleminiz varsa (HIV, tüberküloz, konjestif kalp yetmezliği, KOAH (Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı), kötü beslenme (kaşeksi), radyoterapi ve kemoterapi tedavisi vs.) veya bu tür etkisi olan bir ilaç kullanıyorsanız,
- Anestezi altında cerrahi bir işlem geçirecekseniz. Genel anestezi ile planlanan cerrahi işlemde en az 48 saat önce KOMBOGLYZE kullanmayı bırakınız ve işlemde en az 48 saat sonrasına kadar yeniden KOMBOGLYZE kullanmaya başlamayınız; ilacı bırakmadan ve ilaca başlamadan önce doktorunuzun önerilerini uygulayınız.

Sürekli, şiddetli karın ağrısı gibi akut pankreatit (pankreas iltihabı) şüphesi oluşturacak belirtileriniz varsa, doktorunuza danışınız.

Diyabetik deri yaraları, şeker hastalığıyla birlikte ortaya çıkan yaygın bir rahatsızlıktır. Saksagliptin ve saksagliptin ile aynı sınıftan bazı şeker (diyabet) ilaçları ile tedavide deri döküntüsü gözlenmiştir. Doktorunuzun veya hemşirenizin deri ve ayak bakımı konusundaki önerilerini uygulayınız.

Böbrek testleri veya kontrolleri

KOMBOGLYZE ile tedavi sırasında:

- Doktorunuz böbreklerinizin ne kadar iyi çalıştığını kontrol edecektir.
- Kontrolünü yılda en az bir kez yapacaktır.

Aşağıdaki durumlarda böbreklerinuz daha sık kontrol edilecektir:

- Yaşlıysanız,
- Böbreklerinuz olması gerektiği kadar iyi çalışmıyorsa (veya kötüleşme riski varsa).

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KOMBOGLYZE'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması:

KOMBOGLYZE kullanırken alkol almayınız. Alkol özellikle karaciğer problemlerinuz varsa veya aç kalmışsanız laktik asidoz riskini arttırabilir (bkz. bölüm "Olası yan etkiler nelerdir?")

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız KOMBOGLYZE kullanmayınız. KOMBOGLYZE'nin bebeğiniz üzerinde zararlı etkileri olabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi planlıyorsanız KOMBOGLYZE kullanmayınız. Metformin küçük miktarlarda insan sütü ile atılmaktadır.

Araç ve makine kullanımı

Saksagliptin ve metforminin araç ve makine kullanma yetisi üzerinde ihmal edilebilir düzeyde etkileri olabilir. Eğer KOMBOGLYZE alırken sersemlik hissediyorsanız, araç veya makine kullanmayınız. Belirtileri halsizlik, sersemlik, terlemede artış, hızlı kalp atışı, görme bozuklukları veya konsantrasyon bozukluğu olan kan şekerinizin düşmesi (hipoglisemi), araç ve makine kullanma ya da güvenli çalışma yeteneğinizi etkileyebilir. Bu ilacın, insülin ve sülfonilüreler gibi kan şekerinde düşmeye neden olduğu bilinen ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılması durumunda hipoglisemi riski söz konusudur.

KOMBOGLYZE'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

KOMBOGLYZE'nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle, aşağıdaki etkin maddelerden herhangi birini içeren bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza bildirmelisiniz:

- Alkol içeren ilaçlar,
- Simetidin (mide rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç),
- Ketokonazol (mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır),
- Bronkodilatörler (beta-2 agonistler) (astımı tedavi etmek için kullanılırlar),
- Diüretikler (İdrar söktürücü ilaçlar, böbreklerinuzin ürettiği idrar miktarını arttırmak için kullanılırlar),
- Diltiazem (yüksek kan basıncı veya bazı kalp hastalıkları için kullanılır),
- Rifampisin (tüberküloz –verem– gibi enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan bir antibiyotik),

- Kortikosteroidler, örneğin deksametazon, fludrokortizon, hidrokortizon, prenizolon gibi (astım ve eklem iltihabı gibi hastalıklarda iltihabı tedavi etmek için kullanılırlar),
- Karbamazepin, fenobarbital veya fenitoin (sara nöbetlerin veya uzun süreli ağrıların tedavisinde kullanılırlar).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. KOMBOGLYZE nasıl kullanılır?

Bu ilacı daima doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz doktorunuz veya eczacınız ile görüşünüz.

Doktorunuz KOMBOGLYZE'yi kanınızdaki şeker miktarını düşüren insülin ile birlikte reçete ederse, sağlığınız için en iyi sonuçlara ulaşmak amacıyla diğer ilacı doktorunuzun söylediği şekilde almayı unutmayınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

- Kullanmanız gereken KOMBOGLYZE dozu, durumunuza ve halen kullanmakta olduğunuz metformin dozuna ve/veya ayrı tabletler halinde alınan saksagliptin ve metformin dozuna bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Doktorunuz, kullanmanız gereken KOMBOGLYZE dozunu size söyleyecektir.
- Önerilen doz, günde iki kez alınan birer tablettir.

Uygulama yolu ve metodu:

- KOMBOGLYZE ağızdan alınır.
- KOMBOGLYZE'yi yemeklerle birlikte almak mide rahatsızlığı riskini azaltabilir.

Diyet ve egzersiz:

Şeker hastalığınızı kontrol etmek için, bu ilacı alıyor olsanız dahi diyet ve egzersize devam etmeniz gerekir. Bu nedenle, size doktorunuz veya hemşireniz tarafından verilmiş olan diyet ve egzersiz önerilerine uymaya devam etmeniz önemlidir. Özellikle şeker hastalığınıza uygun bir diyet uyguluyorsanız, KOMBOGLYZE'yi kullanırken bu diyete devam etmelisiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

KOMBOGLYZE'nin çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılması önerilmemektedir. Bu yaş grubunda etkili ve güvenli olup olmadığı bilinmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlanmayla birlikte böbreklerinizin fonksiyonları bozulabilir. Doktorunuz kullanmanız gereken KOMBOGLYZE dozunu böbrek fonksiyonlarınıza göre ayarlayacaktır. Düzenli olarak doktorunuzla görüşünüz. 75 yaş ve üzeri hastalarda saksagliptin ile deneyim çok sınırlıdır ve bu popülasyon tedavi edilirken dikkatli olunmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliđi:

KOMBOGLYZE orta ila ağır derecede böbrek yetmezliđi olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Karaciđer yetmezliđi:

KOMBOGLYZE karaciđer yetmezliđi olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eđer KOMBOGLYZE'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduđuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KOMBOGLYZE kullandıysanız:

KOMBOGLYZE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KOMBOGLYZE'yi kullanmayı unutursanız:

Eđer bir doz KOMBOGLYZE almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz bu dozu alınız. Bununla birlikte, eđer bir sonraki dozu alma zamanınız geldiyse, unuttuđunuz dozu atlayınız ve bir sonraki dozu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

KOMBOGLYZE ile tedavi sonlandırıldıđında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz tedaviyi sonlandırmanızı söyleyene kadar KOMBOGLYZE kullanmaya devam ediniz. Bu ilaç kan şekerinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olmak içindir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, KOMBOGLYZE'nin içeriđinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiđi şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1,000 hastanın birinden az, fakat 10,000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10,000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile tahmin edilememektedir.

KOMBOGLYZE içeriđindeki etkin maddelerden biri olan metformin çok seyrek (10,000 hastanın birinden az görülebilir) görülen; fakat ciddi bir yan etki olan **“laktik asidoza”** yol açabilir. Bu durum kanda laktik asit birikmesidir ve ölüme neden olabilir. Laktik asidoz tıbbi bir acil durumdur ve hastanede tedavi edilmelidir. Laktik asidoz özellikle böbrekleri iyi çalışmayan hastalarda ortaya çıkmaktadır.

Aşağıdaki “laktik asidoza” ilişkin belirtilerden biri olursa, KOMBOGLYZE'yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Üşüme veya rahatsızlık hissetme
- Kendini hasta hissetme veya hasta olma hali veya mide ağrısı
- Nedenini açıklayamadığınız kilo kaybı

- Kas krampları
- Hızlı solunum

KOMBOGLYZE'nin diğer yan etkileri şunlardır:

Yaygın

- Baş ağrısı
- Kas ağrısı (miyalji)
- Kendini hasta hissetme veya sindirim bozukluğu (dispepsi)
- İdrar yollarında enfeksiyon
- Üst solunum yollarında enfeksiyon
- Soğuk algınlığı veya boğaz ağrısında olduğu gibi burun veya boğazda iltihap (nazofarenjit)
- Genellikle bir enfeksiyondan kaynaklanan (gastroenterit) mide (gastrit) veya barsak iltihabı
- Yanak ve gözlerin arkasında ağrı ve doluluk hissi ile üst solunum yolu enfeksiyonu (sinüzit)
- Kusma
- Gaza bağlı mide-barsakta şişkinlik
- Sersemlik
- Yorgunluk
- Bulantı

Yaygın olmayan

- Eklem ağrısı (artralji)
- Ereksiyona ulaşma veya sürdürmede zorluk (erektile disfonksiyon)
- Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Saksagliptinin pazarlama sonrası kullanımı sırasında, ciddi alerjik reaksiyonlar (anafilaksi) ile nefes alma veya yutkunmada zorlanmaya sebep olabilecek yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişme gibi ilave yan etkiler bildirilmiştir. Eğer alerjik reaksiyon geliştirse, KOMBOGLYZE kullanmayı durdurunuz ve hemen doktorunuzu arayınız. Doktorunuz, size alerjik reaksiyonunuzu tedavi etmek için bir ilaç ve şeker hastalığınız için farklı bir ilaç reçete edebilir.

Yaygın olmayan sıklıkta pankreatit (pankreas iltihabı) vakaları bildirilmiştir. Pankreatit; ciddi, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden tıbbi bir durum olabilir. Eğer kusma ile birlikte olan ya da olmayan, şiddetli ve sürekli karın ağrınız varsa doktorunuzu arayınız; çünkü pankreatitiniz olabilir.

Tek başına saksagliptin alırken görülen yan etkiler:

Yaygın

- Sersemlik
- Yorgunluk

Bazı hastaların kan testinde beyaz kan hücrelerinden birinin (lenfositler) sayısında hafif bir azalma olmuştur. Buna ilaveten, bazı hastalarda saksagliptin kullanırken deri döküntüsü ve deri reaksiyonları dahil aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir.

Tek başına metformin alırken görülen yan etkiler:

Çok yaygın

- Bulantı, kusma
- İshal veya karın ağrısı

- İştah kaybı

Yaygın

- Ağızda metalik tat

Çok seyrek

- B12 vitamini düzeylerinde azalma
- Karaciğer problemleri (sarılık)
- Kurdeşen, deride kızarma (deri döküntüsü) veya kaşıntı
- Laktik asidoz

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz.

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. KOMBOGLYZE’nin saklanması

KOMBOGLYZE’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Blisterin ve kartonun üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra KOMBOGLYZE’yi kullanmayınız.

Son kullanma tarihi belirtilen ayın son gününü ifade etmektedir.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz KOMBOGLYZE’yi kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacı ile kullanmadığınız KOMBOGLYZE’yi şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:

AstraZeneca İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti.

Büyükdere Cad.Yapı Kredi Plaza B Blok Kat 3-4

Levent 34330 - İstanbul

Üretim yeri:

AstraZeneca Pharmaceuticals LP
Mount Vernon/ABD

Bu kullanma talimatı 02.04.2016 tarihinde onaylanmıştır.