

KULLANMA TALİMATI

SYMBICORT™ RAPIHALER 160/4.5 mcg/doz basınçlı inhalasyon süspansiyonu
Solunum yoluyla uygulanır.

Etkin madde: Her püskürtme 160 mikrogram budesonid ve 4.5 mikrogram formoterol fumarat dihidrat içerir.

Yardımcı maddeler: Apafluran (HFA 227), povidon K25, makrogol 1000.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek** veya **düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **SYMBICORT RAPIHALER nedir ve ne için kullanılır?**
2. **SYMBICORT RAPIHALER’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **SYMBICORT RAPIHALER nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **SYMBICORT RAPIHALER’in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. SYMBICORT RAPIHALER nedir ve ne için kullanılır?

- SYMBICORT RAPIHALER inhalasyon (solunum) yoluyla kullanılan bir ilaçtır.
- SYMBICORT RAPIHALER gri toz kapaklı kırmızı plastik püskürtme kabına yerleştirilmiş doz göstergeli basınçlı tüp içinde beyaz inhalasyon süspansiyonu içeren bir inhalerdir. SYMBICORT RAPIHALER içinde nem çekici bulunan alüminyum folyo poşette bir adet inhaler içeren ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Her bir inhaler kullanıma hazırlandıktan sonra 120 püskürtme içerir.
- SYMBICORT RAPIHALER’de etkin madde olarak budesonid ve formoterol fumarat dihidrat bulunur. Her püskürtme 160 mikrogram budesonid ve 4.5 mikrogram formoterol fumarat dihidrat içerir.
 - Budesonid “kortikosteroidler” adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Budesonid akciğerlerinizdeki şişmeyi ve iltihabı azaltarak ve önleyerek etki gösterir.
 - Formoterol fumarat dihidrat “uzun etkili beta2 adrenoseptör agonistleri” veya “bronkodilatörler” adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Formoterol fumarat dihidrat solunum yollarınızdaki kasları gevşeterek etki gösterir. Bu etki daha kolay nefes alıp vermenize yardımcı olur.
- SYMBICORT RAPIHALER, yetişkinlerde kronik tıkalı akciğer hastalığının (KOAH) belirtilerinin tedavisinde kullanılan bir inhalerdir. KOAH, genellikle sigara içmenin neden olduğu solunum yollarının uzun süreli bir hastalığıdır.
- SYMBICORT RAPIHALER, “rahatlatıcı inhaler” olarak kullanılmamalıdır.

2. SYMBICORT RAPIHALER’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SYMBICORT RAPIHALER’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

- Budesonide, formoterole veya bu ilacın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa.

SYMBICORT RAPIHALER’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlardan biri sizin için geçerliyse, SYMBICORT RAPIHALER’i kullanmaya başlamadan önce doktorunuzla veya eczacınızla görüşünüz:

Eğer:

- Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa,
- Akciğerlerinizde iltihaplanma varsa,
- Yüksek tansiyonunuz varsa veya bugüne kadar kalp sağlığınızla ilgili bir problem yaşadysanız (düzensiz kalp atışı, çok hızlı nabız, atardamarlarda daralma veya kalp yetmezliği dahil),
- Tiroid veya böbreküstü bezlerinizle ilgili problemlerinizi varsa,
- Kanınızda potasyum düzeyi düşükse,
- Ağır karaciğer rahatsızlığınız varsa.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SYMBICORT RAPIHALER’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

SYMBICORT RAPIHALER solunum yoluyla uygulanır. Bu nedenle yiyecek ve içeceklerle etkileşmesi beklenmemektedir. Bununla birlikte ilacın solunması esnasında yiyecek ve içecek alımından kaçınılmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, SYMBICORT RAPIHALER’i kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuz aksini söylemedikçe SYMBICORT RAPIHALER’i kullanmayınız.

SYMBICORT RAPIHALER’i kullanırken hamile kalırsanız, SYMBICORT RAPIHALER’i kullanmayı bırakmayınız; ancak derhal doktorunuzla görüşünüz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız SYMBICORT RAPIHALER’i kullanmadan önce doktorunuzla görüşünüz.

Araç ve makine kullanımı

SYMBICORT RAPIHALER’in araç veya makine kullanma beceriniz üzerinde herhangi bir etkisi yoktur ya da ihmal edilebilir düzeyde etkisi vardır.

SYMBICORT RAPIHALER'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SYMBICORT RAPIHALER'in içeriğinde özel uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka ilaçlar kullanıyorsanız, yakın zamanda kullandıysanız veya kullanma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

- Göz içi basıncındaki artışın (glokom) tedavisinde kullanılan göz damlaları dahil (timolol gibi) yüksek tansiyon tedavisi için kullanılan beta blokör ilaçlar (atenolol veya propranolol gibi),
- Hızlı veya düzensiz kalp atışları için kullanılan ilaçlar (kinidin gibi),
- Çoğunlukla kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan digoksin gibi ilaçlar,
- Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan "idrar söktürücü" olarak da bilinen diüretikler (furosemid gibi),
- Ağızdan alınan steroid ilaçlar (prednizolon gibi),
- Çoğunlukla KOAH veya astım tedavisinde kullanılan ksantin türevi ilaçlar (teofilin veya aminofilin gibi),
- Diğer solunum yolu genişleticiler (salbutamol gibi),
- Depresyon tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresanlar (amitriptilin gibi) ve nefazodon,
- Sinir hastalıkları tedavisinde kullanılan fenotiyazin türevi ilaçlar (klorpromazin ve proklorperazin gibi),
- HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan "HIV-proteaz inhibitörleri" olarak adlandırılan ilaçlar (ritonavir gibi),
- Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, klaritromisin ve telitromisin gibi),
- Parkinson Hastalığı'nda kullanılan ilaçlar (leva-dopa gibi),
- Tiroid problemlerinde kullanılan ilaçlar (levo-tiroksin gibi).

Eğer yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse veya emin değilseniz, SYMBICORT RAPIHALER'i kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınızla görüşünüz.

Ayrıca ameliyat veya diş tedavisi için genel anestezi alacaksanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. SYMBICORT RAPIHALER nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

- Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- SYMBICORT RAPIHALER'i, o anda KOAH belirtileriniz olmasa dahi, her gün kullanmaya devam etmeniz önemlidir.

Normal doz günde iki kez 2 inhalasyondur.

Eğer KOAH için steroid tabletler kullanıyorsanız, SYMBICORT RAPIHALER kullanmaya başladığınızda doktorunuz aldığınız tablet sayısını azaltabilir. Eğer uzun bir süredir oral steroid tabletleri kullanıyorsanız, doktorunuz zaman zaman kan testi yaptırmanızı isteyebilir. Oral steroid tabletleri azaltırken, göğsünüz ile ilgili belirtiler düzelse dahi genel olarak kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı, güçsüzlük veya eklem ya da kas ağrısı ve döküntü (egzama) gibi belirtiler yaşayabilirsiniz. Bu belirtilerden herhangi biri sizi endişelendirirse veya baş ağrısı, yorgunluk, bulantı (hasta hissetme) ya da kusma (hasta olma) gibi belirtiler ortaya çıkarsa derhal doktorunuzla iletişime geçiniz. Alerji veya eklem iltihabı belirtileriniz olması halinde başka bir ilaç almanız gerekebilir. SYMBICORT RAPIHALER’i kullanmaya devam edip etmeme konusunda endişe yaşıyorsanız doktorunuzla konuşmanız gerekir.

Stres dönemlerinde (örn., göğüs enfeksiyonunuz varken veya bir ameliyat öncesinde) doktorunuz her zamanki tedavinize steroid tabletleri eklemeyi düşünebilir.

KOAH belirtileri hakkında önemli bilgi

Eğer SYMBICORT RAPIHALER’i kullanırken nefessiz kalma hissi yaşarsanız veya hırıltı olursa, SYMBICORT RAPIHALER’i kullanmaya devam etmeli; ancak ek tedaviye ihtiyacınız olabileceğinden mümkün olan en kısa süre içinde doktorunuz ile görüşmelisiniz.

Aşağıdakilerden biri sizin için söz konusu olursa derhal doktorunuzla iletişime geçiniz:


- Nefes alıp vermeniz kötüleşirse veya gece sık sık nefessiz kalıp uyanırsanız
- Sabahları göğsünüzde sıkışma hissetmeye başlarsanız veya göğüs sıkışması her zamankinden daha uzun sürüyorsa
- Bu bulgular KOAH’ınızın gerektiği gibi kontrol edilmediği anlamına gelebilir ve derhal başka veya ek tedaviye ihtiyacınız olabilir.

KOAH için doktorunuz antikolinerjik ilaçlar (tiotropiyum veya ipratropium bromür) gibi başka solunum yolu gevşetici ilaçlar reçete edebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

SYMBICORT RAPIHALER’iniz hakkında bilgi

- İnhalerin parçaları resimde gösterilmektedir. İnhaleri teslim aldığımızda inhaler birleştirilmiş halde olacaktır. Parçalarına ayırmayınız. Eğer tüp gevşerse inhalere geri takıp kullanmaya devam ediniz.



Şekil 1


SYMBICORT RAPIHALER'inin hazırlanması

SYMBICORT RAPIHALER'inizi kullanmaya başlamadan önce folyo poşetinden çıkarınız. Poşeti ve bunun içinde bulunan nem çekiciyi atınız. İnhaleriniz yeniyse, bir hafta veya daha uzun bir süredir kullanılmadıysa veya yere düştüyse, hafifçe çalkalayın ve kullanıma hazır hale getirmek için havaya doğru 2 püskürtme gerçekleştirin.


İnhaler'in kullanılmasına yönelik yollar



Şekil 2




Şekil 3



Şekil 4

İnhalerinizi kullanımına hazırlamak için aşağıdaki talimatlara uyunuz:

1. Her kullanmadan önce inhaleleri hafifçe sallayınız.
2. Yan kısımlardaki çıkıntılara hafifçe bastırarak ağızlığı çıkarınız. Kapağın altındaki ağızlık inhaleler cihaza bağlı kalacaktır. (bakınız Şekil 2)
3. Solunum cihazınızı, cihazın alt kısmında başparmak (parmaklarınızı) ve üst kısmında işaret parmağınızı (parmaklarınızı) kullanarak ağızlığın önüne dik tutun. Daha sonra mümkün olduğu kadar nefes veriniz, ağızlığı hafifçe ağızınıza, dişleriniz arasına koyun ve etrafını dudaklarınız ile kapatın.
4. Ağızınızdan yavaş, rahatça ve derin nefes almaya başlayınız. Bir püskürtme için inhalelere sıkıca basınız.
5. Nefes almaya devam ediniz ve nefesinizi 10 saniye ya da kendinizi rahat hissettiğiniz süre boyunca tutunuz, inhaleleri ağızınızdan çıkarınız ve parmağınızı sayaçtan çekiniz. Doktorunuzun yönlendirmesine uygun şekilde başka bir püskürtme alın, inhaleleri yavaşça sallayın ve ardından 3-5 arasındaki adımları tekrarlayın.
6. Toz ve diğer pisliklerin ilacınıza girmesini engellemek için hafifçe tık sesi duyana kadar iterek ağızlık kapağını geri koyun
7. Fazla gelen ilacı uzaklaştırmak için ağızınızı su ile çalkalayınız.



Şekil 5

Bakımdan sorumlu kişiler, SYMBICORT RAPIHALER reçete edilen hastaların doğru inhalasyon tekniğini kullandıklarından emin olmalıdır.

SYMBICORT RAPIHALER' inizin temizlenmesi

İnhaler ağızlığı düzenli olarak, haftada en az bir kez temizlenmelidir. Bunun için:

- Ağızlık kapağını çıkarınız.
- Temiz, kuru bez ile ağızlığın içi ve dışını temizleyiniz.
- Ağızlığın kapağı yeniden yerleştiriniz.
- İnhalerinizi suya koymayınız.
- İnhaleri parçalarına ayırmaya çalışmayınız.

Sayacın okunması:

İnhalerinizin üst kısmındaki sayaç, SYMBICORT RAPIHALER'inizde kaç püskürtme kaldığını size gösterecektir.



- Her inhalasyon aldığınızda veya havaya bir püskürtmede ok sıfıra ("0") doğru hareket eder. (ya inhalasyon cihazınızı kullanmaya hazırlarken ya da ilacı aldığınızda)
- Ok sarı alana ilk girdiğinde bu, yaklaşık 20 püskürtme kaldığını gösterir.



- Sayacı okuyarak SYMBICORT RAPIHALER inhalerinizde kalan püskürtme sayısını not etmeniz çok önemlidir. Ok "0" a ulaştığında SYMBICORT RAPIHALER' inizi kullanmayı bırakmalısınız. İnhalerinizin boş olmadığını hissedebilirsiniz ve hala

alıřıyor gibi grnebilir. Bununla birlikte kullanmaya devam ederseniz doęru ila miktarını alamazsınız.

Deęiřik yař grupları:

ocuklarda kullanımı:

SYMBICORT RAPIHALER 18 yařın altındaki ocuklar ve ergenler iin nerilmemektedir.

Yařlılarda kullanımı:

Yařlı hastalar iin herhangi bir zel doz gereksinimi bulunmamaktadır.

zel kullanım durumları:

Bbrek yetmezlięi:

SYMBICORT RAPIHALER'in bbrek yetmezlięi olan hastalarda kullanımına iliřkin veri mevcut deęildir.

Karacięer yetmezlięi:

SYMBICORT RAPIHALER'in karacięer yetmezlięi olan hastalarda kullanımına iliřkin veri mevcut deęildir. Budesonid ve formoterol etkin maddeleri esasen karacięerde metabolize olarak elimine olduklarından, aęır karacięer sirozu olan hastalarda maruziyette artıř beklenebilir.

Eęer SYMBICORT RAPIHALER'in etkisinin ok gl veya zayıf olduęuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuřunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SYMBICORT RAPIHALER kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden daha fazla SYMBICORT RAPIHALER kullandıysanız titreme, bař aęrısı veya kalp atıřınızda hızlanma grlebilir.

SYMBICORT RAPIHALER'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmıřsanız bir doktor veya eczacı ile konuřunuz.

SYMBICORT RAPIHALER'i kullanmayı unutursanız:

Bir doz almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz alınız. Bununla birlikte neredeyse bir sonraki doz zamanı gelmiřse, unutulmuş dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek iin ift doz uygulamayınız.

SYMBICORT RAPIHALER ile tedavi sonlandırıldıęında oluřabilecek etkiler:

SYMBICORT RAPIHALER'i kullanmayı bırakmadan nce doktorunuzla veya eczacınızla grřünüz. Eęer SYMBICORT RAPIHALER'i kullanmayı bıraktırsanız, KOAH bulgu ve belirtileriniz ktleřebilir.

Bu ilacın kullanımı ile ilgili bařka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tm ilalar gibi, SYMBICORT RAPIHALER'in ierięinde bulunan maddelere duyarlı olan kiřilerde yan etkiler olabilir; fakat yan etkiler herkeste grlmez.

Yan etkiler ařaęıdaki kategorilerde gsterildięi řekilde sıralanmıřtır:

ok yaygın : 10 hastanın en az 1'inde grlebilir.

- Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SYMBICORT RAPIHALER’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Yüzünüzde, özellikle ağzınızın etrafında (dil ve/veya boğaz ve/veya yutma güçlüğü) şişme, nefes alma güçlüğü ile birlikte döküntü veya kurdeşen (anjiyoödem) ve/veya ani bayılma hissi. Bu belirtiler alerjik reaksiyon geçirmekte olduğunuz anlamına gelebilir. Bu çok ciddi yan etki seyrek görülür.
- İnhalerinizi kullandıktan hemen sonra ani hırıltı ve nefes darlığı. Bu belirtilerden herhangi biri olursa SYMBICORT RAPIHALER’i kullanmayı derhal kesiniz ve “rahatlatıcı” inhaler kullanınız. Tedavinizde değişiklik yapılması gerekebileceğinden derhal doktorunuzla iletişime geçiniz. Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

SYMBICORT RAPIHALER’in diğer olası yan etkileri şunlardır:

Yaygın

- Çarpıntı (kalp atışınızı hissetmeniz), titreme veya sallanma. Bu etkiler, genellikle hafif şiddette görülür ve SYMBICORT RAPIHALER kullanmaya devam ettikçe kaybolur.
- Ağızda pamukçuk (bir mantar iltihabı). SYMBICORT RAPIHALER’i kullandıktan sonra ağzınızı su ile yıkamanız durumunda olasılığı daha azdır.
- Hafif boğaz tahriş, öksürük ve ses kalınlaşması
- Baş ağrısı
- Akciğer enfeksiyonu (pnömoni)
- Bulanık görme

Yaygın olmayan

- Huzursuz, sinirli veya heyecanlı hissetmek, endişelilik hali
- Uyku bozukluğu
- Sersemlik hissi
- Bulantı (hasta hissetme)
- Hızlı kalp atışı
- Ciltte morarmalar
- Kas krampları

Seyrek

- Deri döküntüsü, kaşıntı
- Bronkospazm (solunum yollarındaki kasların kasılarak hırıltıya neden olması). Hırıltı SYMBICORT RAPIHALER kullandıktan sonra aniden gelişirse, SYMBICORT RAPIHALER’i kullanmayı bırakınız ve derhal doktorunuzla görüşünüz.
- Kan potasyum seviyesinde düşme
- Düzensiz kalp atışı

Çok seyrek

- Depresyon
- Özellikle çocuklarda davranış bozuklukları
- Göğüste ağrı veya sıkışma (anjina pektoris)
- Kandaki şeker (glukoz) düzeyinde artış
- Tat almada değişiklikler, örneğin ağızda hoş olmayan tat gibi
- Kan basıncında değişimler
- Kalbinizde normal olmayan elektriksel sinyal üretimi (QTc aralığının uzaması)
- Kandaki kortizol seviyesinin fazla artmasına bağlı kilo artışına, yüzde yuvarlaklaşmaya, yüksek kan basıncına ve aşırı kıllanmaya yol açan, bir böbreküstü bezi hastalığı olan Cushing sendromu, böbrek üstü bezlerinin baskılanması, büyüme geriliği, kemik mineral yoğunluğunda azalma (kemiklerin incelmeleri)
- Katarakt (gözdeki lensin bulutlanması)
- Glokom (göz içi basıncının artması)

Solunum yoluyla alınan kortikosteroidler, özellikle uzun süreli olarak yüksek dozda alındığında vücudunuzdaki normal steroid hormonu üretimini etkileyebilir. Etkiler şunlardır:

- Kemik mineral yoğunluğunda değişiklikler (kemiklerin incelmeleri)
- Katarakt (gözdeki lensin bulutlanması)
- Glokom (göz içi basıncının artması)
- Çocuk ve ergenlerde büyüme hızında yavaşlama
- Adrenal bez (böbreğe komşu küçük bir bez) üzerinde etki

Bu etkilerin meydana gelme olasılığı, kortikosteroid tabletler ile karşılaştırıldığında solunum yoluyla alınan kortikosteroidler ile çok daha düşüktür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bildirin.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. SYMBICORT RAPIHALER’in saklanması

SYMBICORT RAPIHALER’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Etiket, folyo poşetin ve kartonun üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra SYMBICORT RAPIHALER’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi belirtilen ayın son gününü ifade etmektedir.

30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Buzdolabına koymayınız ya da dondurmayınız.

Donmaya ve doğrudan güneş ışığına karşı koruyunuz.

Kullanıldıktan sonra ağızlığın kapağı sıkıca geri takılmalı ve ağızlık yerine oturtulmalıdır.

Basınçlı kaplar içinde bulunan çoğu inhale ürün gibi bu tıbbi ürünün etkisi kap soğuk olduğunda azalır. En iyi sonuçlar için bu ilaç kullanılmadan önce oda sıcaklığında olmalıdır. Tüpün içinde basınçlı sıvı bulunmaktadır. 50°C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır. Tüp delinmemelidir. Tüp, görünüşte boş olsa dahi kırılmamalı, delinmemeli veya yakılmamalıdır.

İnhaleleri poşetinden çıkardıktan sonra 3 ay içinde kullanmanız gerekir. İnhaleleri ne zaman kullanmayı bırakacağınızı size hatırlatması için inhaleler etiketi üzerine son kullanma tarihini yazınız (poşet açıldıktan itibaren 3 ay).

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SYMBICORT RAPIHALER'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti.
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok
Kat 3-4 34330 Levent-İstanbul

Üretim yeri: AstraZeneca Dunkerque Production, Dunkerque/Fransa

Bu kullanma talimatı 12.02.2019 tarihinde onaylanmıştır.